



Nombre: _____

GUIA 2: "ITS" (parte 2)

Objetivo: Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas

Tema 2 → ¿Cuál es la realidad social en nuestro país sobre las ITS? (Parte 2)

1. Las gráficas de esta sección tienen como fuente la página <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/sifilis-y-gonorrea-casos-ultimos-20-anos/673245/>. Sobre ellas tendrás que realizar las actividades propuestas de este tema.

D. ¿Cuál de las dos infecciones tiene mayor cantidad de casos de los últimos 20 años (al 2019)?

E. ¿Cuál fue el año con menor y mayor cantidad de contagios de gonorrea (entre 2000 y 2018)?

F. ¿Cuál fue el año con menor y mayor cantidad de contagios de sífilis (entre 2000 y 2018)?


G. ¿Desde el 2010 al 2018 cuál fue el año con mayor cantidad de contagios de gonorrea y sífilis?

CASOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Gonorrea
(tasa x cien mil habitantes)

Total casos últimos 20 años:

34.286




Sífilis

(tasa x cien mil habitantes)

Total casos últimos 20 años:

74.692



*Provisorio

** Enero-marzo 2019 (provisorio)

*** Enero Abril 2019 (provisorio)

FUENTE: Epidemiología / Minsal

INFOGRAFÍA: Heglár Fleming - LA TERCERA

H. ¿Cuál será la tendencia, a la baja o al alza en los contagios de las ITS estudiadas? Fundamenta según los datos.

2. Ingresa a la noticia “Gonorrea: la peligrosa enfermedad sexual que crece en Chile” en el link <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/gonorrea-enfermedad-sexual-chile/316337/> y responde las siguientes preguntas.

A. ¿Qué es la gonorrea a quienes afecta y qué órganos puede ver comprometidos?

B. ¿Cuál es el grupo de edad más afectado? _____

C. ¿Qué factores indican los expertos que facilitan el contraer las ITS en general?

D. ¿Cuál es el grupo, según un experto, más afectado de la población por la gonorrea?

E. ¿Cómo se manifiesta la gonorrea en mujeres y por qué sería difícil de detectar en ellas?

F. ¿Qué problema genera el uso excesivo de antibióticos para el tratamiento de enfermedades hoy en día?

Tema 3 → VIH: mejor estar informados.

1. Ingresa al siguiente link de la OMS <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids> y responde según lo que allí se indica.

A. ¿Qué es el VIH y qué afecta en el ser humano?

B. ¿Qué diferencia la infección por VIH del SIDA?

C. Completa la siguiente tabla de manera breve con lo solicitado:

Cuadro resumen: VIH	
Formas de transmisión	Síntomas
Factores de riesgo	
Diagnóstico	

Para continuar trabajando con la guía, tendrás que tener a mano el siguiente documento:

2017, MINSAL, “Protocolo para la Información, apoyo, manejo y seguimiento de los adolescentes de edad igual o superior a 14 y menores de 18 años en la detección del VIH”

Disponible en la web de Emmanuel.cl y en: https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.07_Protocolo-VIH-Adolescentes-2017color.pdf

2. Responde ¿Qué sucedió el año 2016 con la población de 15 a 19 años respecto del VIH? (p. 6)

3. En el sistema público de salud, en el nivel primario de atención, ¿dónde se puede realizar el examen de detección de VIH? (p. 7)

4. Responde SÍ o NO a las siguientes preguntas sobre las siguientes afirmaciones (p. 8 – 13)

A. “El diagnóstico de VIH puede ser solicitado para un adolescente solo por su tutor legal” _____

B. “El compartir una jeringa para el consumo de drogas endovenosas es un motivo para ser examinado por VIH” _____

C. “Todas las prácticas sexuales realizadas con condón excluyen un motivo de consulta para ser examinado por VIH” _____

D. “Tener más de dos parejas sexuales en un mismo año es de por sí un motivo para solicitar un test de VIH” _____

E. “Se considera que la fiebre, dolores corporales y malestar general unidos son una manifestación evidente de SIDA” _____

F. “Se considera que una infección crónica considera síntomas como pérdida de peso (menor a 10 Kg), síndrome de diarrea por más de un mes, contraer candidiasis en la boca y faringe o vagina por más de un mes, haber tenido más de un episodio de herpes” _____

G. “La tuberculosis pulmonar o extrapulmonar por sí sola no es indicadora de haber alcanzado la condición de una persona con SIDA” _____

H. “Un adolescente por sí solo podría consentir un examen de VIH solo notificándole a su tutor en caso de resultar positivo” _____

I. “El profesional que atiende al adolescente le solicitará datos de su tutor legal y agendará una fecha para la entrega del examen dentro de un plazo establecido” _____

J. “La consejería para la prevención del VIH es obligatoria” _____

K. “La toma de muestra del VIH no puede realizarse en cualquier centro de salud, ya que no todos cumplen con la Ley 19.779 y la Ley 20.987” _____

L. “La recepción de los resultados de VIH en personas entre los 14 y los 18 no precisa mediar de una consejería, a no ser que estos sean positivos para VIH” _____

M. “La recepción de resultados para VIH negativo y positivo deben ser en compañía de su representante legal, únicamente” _____

5. El siguiente esquema o flujograma explica el protocolo desde la solicitud de examen de VIH para un adolescente (puedes verlo en mayor tamaño en la p. 20).

Explica: ¿qué debería suceder por protocolo si el resultado del examen de VIH para un adolescente es positivo?

FLUJOGRAMA

